

多発性骨髄腫

レジメン名	薬剤名	投与量	投与時間	投与方法	投与日	1コース期間
BD	ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注	day 1, 4, 8, 11	21
BD【維持療法】	ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注	day 1, 8, 15, 22	35
DqRd	ダラキューロ	1,800mg/body	3-5分	皮下注	day 1	28
	レブラミド	25mg/body		内服	day 1-21	
DqBd	ダラキューロ	1,800mg/body	3-5分	皮下注	day 1, 8, 15	21
	ベルケイド	1.3mg/m ²		皮下注	day 1, 4, 8, 11	
EPd	エムプリシティ	10mg/kg	医師の指示通り	点滴静注	day 1, 8, 15, 22	28
	ポマリスト	4mg/body		内服	day 1-21	
IsaPd	サークリサ	10mg/kg	医師の指示通り	点滴静注	day 1, 8, 15, 22	28
	ポマリスト	4mg/body		内服	day 1-21	
wKd	カイプロリス	20mg/m ²	30分	点滴静注	day 1	28
	カイプロリス	70mg/m ²	30分	点滴静注	day 8, 15	
VAD	オンコビン	0.4mg/body	24時間	点滴静注	day 1-4	21
	ドキシソルビシン	9mg/m ²	24時間	点滴静注	day 1-4	
VRD	ベルケイド	1mg/m ²		皮下注	day 1, 4, 8, 11	21
	レブラミド	25mg/body		内服	day 1-14	